

Indicación y pauta de vacunación en pacientes con EII y SIN inmunosompromiso <sup>1</sup>				
Tétanos y difteria (Td)	No vacunados previamente		3 dosis iniciales (0, 1 y 7 meses) más 1 dosis cada 10 años hasta completar 5 dosis	
Tétanos, difteria y tos ferina (dTpa)	Embarazadas (a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28)		Administrar 1 dosis en cada embarazo	
Hepatitis B	Personas no inmunizadas (estudio de serología)		3 dosis (0, 1 y 6 meses). Revacunación si títulos de anti-HBs < 100 UI/L	
Gripe	No vacunados el presente año		Revacunación con 1 dosis anual (intramuscular)	
SARS-CoV2 (COVID)	No vacunados previamente		Pauta según recomendaciones nacionales	
Sarampión, Rubeola y paperas (triple vírica-TV-)	Personas no inmunizadas		1 ó 2 dosis (en intervalo ≥ a 28 días)	
Varicela	Personas no inmunizadas		2 dosis (0 y 1-2 meses)	
Virus del papiloma humano	Mujeres y hombres de 11-14 años (hasta 26 años o previo a tener relaciones sexuales). Mujeres >26 con antecedentes de CIN-III o tras conización		3 dosis (0, 1-2, 6 meses)	
Poliomelitis	No vacunados previamente		3 dosis (0, 1-2, 6-12 meses)	
Neumococo <sup>2</sup>	Personas de >65 años	Sin vacunación previa	1 dosis de VCN20	
		Con vacunación previa	Vacunación previa con VPN23	1 dosis de VCN20 (12 meses tras dosis previa)
			Vacunación previa con VCN13 o con VPN23+VCN13	Ninguna dosis
Herpes zóster	Personas de 65 y 80 años (según vayan cumpliendo esa edad) y personas entre 66 y 80 años (priorizando las edades anteriores)		2 dosis (0 y 2-6 meses) (Shingrix®)	

<sup>1</sup>Las indicaciones para vacunación pueden variar en cada Comunidad Autónoma (CCAA) o bajo otros criterios epidemiológicos.

<sup>2</sup>Desde el 2020 algunas CCAA han introducido la vacuna VCN20 (Apexxnar®) con la que se ha modificado el calendario y pautas de vacunación frente al neumococo. Consulta tu CCAA para comprobar la pauta de vacunación establecida frente al neumococo.