

Indicación y pauta de vacunación en pacientes con EII y tratamiento Inmunosupresor <sup>1</sup>				
Tétanos y difteria (Td)	No vacunados previamente		3 dosis iniciales (0, 1 y 7 meses) más 1 dosis cada 10 años hasta completar 5 dosis	
Tétanos, difteria y tos ferina (dTpa)	Embarazadas (a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28)		Administrar 1 dosis en cada embarazo	
Hepatitis B	No vacunados previamente o si anti-HBs <100UI		3 dosis dobles (0, 1 y 2 meses), con <i>booster</i> entre 6-12 meses. Revacunación si títulos de anti-Hbs<100UI/L	
Gripe	No vacunados el presente año		Revacunación con 1 dosis anual (intramuscular)	
SARS-CoV2 (COVID)	No vacunados previamente		Pauta según recomendaciones nacionales	
Sarampión, Rubeola y paperas (triple vírica-TV-)	Contraindicada por ser vacunas de virus vivos atenuados		Siempre que sea posible, se recomienda vacunación previa al inicio de tratamiento inmunosupresor	
Varicela	Contraindicada por ser vacunas de virus vivos atenuados		Siempre que sea posible, se recomienda vacunación previa al inicio de tratamiento inmunosupresor	
Virus del papiloma humano	Mujeres y hombres de 11-14 años (hasta 26 años o previo a tener relaciones sexuales). Mujeres >26 con antecedentes de CIN-III o tras conización		3 dosis (0, 1-2, 6 meses)	
Poliomelitis	No vacunados previamente		3 dosis (0, 1-2, 6-12 meses)	
Neumococo <sup>2</sup>	Personas de ≥18 años	Sin vacunación previa	1 dosis de VCN20 (12 meses tras dosis previa)	
		Con vacunación previa	Vacunación previa con VNP23	1 dosis VCN20 (12 meses tras dosis previa)
			Vacunación previa con VCN13	1 dosis VCN20 (6 meses tras dosis previa)
			Vacunación previa con VNP23+VCN13	1 dosis VCN20 (5 años tras dosis previa)

Herpes zóster	Pacientes de $\geq 50$ años con tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor: anti-TNF, inhibidores de: IL-23 e IL-12/23, corticoides (4 semanas de: prednisona $\geq 20$ mg/día o equivalentes $\geq 10$ mg/día), metotrexate ( $>20$ mg/semana) azatioprina ( $>3$ mg/kg/día) 6-mercaptopurina ( $>1,5$ mg/kg/día) y micofenolato ( $>1$ g/día).  Pacientes de $\geq 18$ años en tratamiento con anti-JAK	2 dosis (0 y 2-6 meses) ( Shingrix <sup>®</sup> ) <sup>3</sup>
<b>VACUNACIÓN OPCIONAL</b>		
Meningococo B (MenB)	Personas no vacunadas	2 dosis (0, 2 meses)
Meningococo C (MenACWY)	Personas no vacunadas	1 dosis única
Haemophilus influenzae tipo b	Personas no vacunadas	1 dosis única

<sup>1</sup>Las indicaciones para vacunación pueden variar en cada Comunidad Autónoma (CCAA) o bajo otros criterios epidemiológicos.

<sup>2</sup>Desde el 2020 algunas CCAA han introducido la vacuna VCN20 (Apexxnar<sup>®</sup>) con la que se ha modificado el calendario y pautas de vacunación frente al neumococo. Consulta tu CCAA para comprobar la pauta de vacunación establecida frente al neumococo.

<sup>3</sup>Personas inmunodeficientes o que pueden llegar a serlo, la segunda dosis puede administrarse entre 1-2 meses de la dosis inicial.